

Abstracts posters

vrouwen zonder gerapporteerde gegevens was hoger dan onder Marokkaanse vrouwen met gerapporteerde gegevens (Chisq; $p < 0,05$).

Turkse en Marokkaanse vrouwen die hun lengte en gewicht niet rapporteren in een gezondheidsenquête hebben vaker overgewicht dan vrouwen die hun gewicht en lengte wel rapporteren. Zelfgerapporteerde lengte- en gewichtgegevens geven daarmee een onderschatting van de overgewichtprevalentie bij deze groepen. Betrouwbare prevalentiecijfers onder Turkse en Marokkaanse vrouwen kunnen alleen verkregen worden via antropometrie.

Seksuele opvattingen en gedragingen: verschillen tussen subgroepen van Antillianen en Arubanen in Rotterdam

A.G. van Dorst, P.L. Kocken
TNO, Leiden

Soa's worden in Nederland vaker bij Antillianen en Arubanen gediagnosticeerd, vergeleken met autochtone Nederlanders. Ook is de incidentie van tienerzwangerschappen en abortussen hoger bij Antilliaanse meisjes, vergeleken met Nederlandse meisjes. Voorgaand onderzoek van de auteurs toonde aan dat cultuur specifieke factoren, zoals macho opvattingen over gender rollen, een belangrijke rol spelen bij het voorspellen intentie tot condoomgebruik bij Antillianen en Arubanen in Nederland. Het huidige onderzoek stelt zich tot doel de verschillen in seksuele opvattingen en gedragingen tussen subgroepen van de Antilliaanse en Arubaanse bevolking in Rotterdam te onderzoeken.

Een steekproef van de Antilliaanse bevolking in Rotterdam (15 tot 50 jaar) is thuis bezocht. In totaal zijn 346 respondenten daadwerkelijk geïnterviewd (netto respons 37,8%). In dit onderzoek wordt de volgende vraagstelling getoetst: zijn opvattingen en gedragingen van Antillianen en Arubanen in Nederland met betrekking tot anticonceptie, seksuele voorlichting, tienerzwangerschappen en macho opvattingen over gender-rollen verschillend, afhankelijk van leeftijd, geslacht en verblijfsduur in Nederland?

Voorlopige resultaten tonen aan dat 51% van de respondenten de pil als vorm van anticonceptie gebruikt. Condoomgebruik met een vaste partner wordt door 19% van de respondenten gerapporteerd. Bij seks met een losse partner, zegt 50% van de respondenten altijd een condoom te gebruiken. Verder was 66% van de respondenten zeker van plan condooms te gebruiken bij seks met een nieuwe partner; 34% was minder positief wat betreft de intentie tot condoomgebruik. Vrouwen blijken een hogere intentie tot condoomgebruik te hebben, vergeleken met mannen (OR=3,71; 95BI=2,32-5,94). Intentie tot condoomgebruik is niet significant verschillend naar leeftijd en verblijfsduur in Nederland. Resultaten van verdere analyses zullen op het congres gepresenteerd worden.

Voorgaand onderzoek toont aan dat cultuur specifieke factoren van belang zijn bij het voorspellen van condoomgebruik. Voorlopige resultaten laten zien dat Antilliaanse vrouwen een hogere intentie tot condoomgebruik hebben, in vergelijking met mannen. Seksuele voorlichting zou gericht moeten zijn op subgroepen, rekening houdend met cultuur specifieke opvattingen en gedragingen wat betreft seksualiteit en veilig vrijen.

Trends in de prevalentie van luchtwegklachten bij schoolgaande kinderen in het zuiden van Limburg

C.M.L. Gielkens-Sijstermans,¹ M. Mommers,² O. van Schaijk,² A. Bovens¹

¹GGD Zuid Limburg, Geleen

²Universiteit Maastricht, Maastricht

E-mail: cindy.gielkens@ggdz.nl

Men is er het wereldwijd over eens dat de prevalentie van luchtwegklachten bij kinderen tussen de 70'er en 90'er jaren gestegen is. Internationale onderzoeken na deze periode zijn echter minder eenduidig. Om trends in het voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen in een regio in het zuiden van Limburg na te gaan, brengt de GGD sinds 1989 de prevalentie van luchtwegklachten bij schoolgaande kinderen in kaart. In 2005/2006 heeft de vijfde peiling plaatsgevonden.

Het betreft een vierjaarlijks vragenlijstonderzoek dat in elk onderzoeksjaar (1989, 1993, 1997, 2001 en 2005/2006) gekoppeld is aan het periodiek geneeskundig onderzoek (PGO) van de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt gebruik gemaakt van de internationaal gestandaardiseerde ISAAC-vragen. Door een verschuiving in de leeftijden van de PGO's nemen aan de meting van 2005/2006 deels andere leeftijdsgroepen deel dan aan de voorgaande onderzoeken, te weten: 5-6 jarigen, 10-11 jarigen (i.p.v. 8-9 jarigen) en voor de eerste maal de 14 jarigen. Daarnaast zijn in het recente onderzoek naast de uitkomstmaten voor astma ook de uitkomstmaten voor hooikoorts en eczeem opgenomen.

In 2005/2006 hebben voor 1.422 van de 1.520 5-6-jarigen (93,6%), voor 1.229 van de 1.274 10-11-jarigen (96,5%) en voor 874 van de 1.072 14-jarigen (81,5%) de ouders een vragenlijst ingevuld (voorlopige cijfers). Bij voorgaande peilingen zijn vergelijkbare responscijfers gehaald.

In het voorjaar van 2007 kunnen de resultaten van de vijfde peiling gepresenteerd worden.

Uit de resultaten van voorgaande peilingen van de luchtwegklachten-monitor van de GGD Zuid Limburg was opvallend dat in tegenstelling tot andere studies, de prevalentie van de klacht 'piepen op de borst' daalde tussen 1989 en 2001 terwijl de prevalentie van de overige astmatische klachten, recente kortademigheid en recente kortademigheid met piepen op de borst steeg tot 1997. Voor deze laatst genoemde klachten was echter ook na 1997 in deze regio een daling te zien. Deze daling kon deels verklaard worden door een toename van de prevalentie van medicijngebruik bij symptomatische kinderen.

In het voorjaar van 2007 kan het vervolg van deze trend aan de hand van de nieuwe resultaten gepresenteerd worden.

Alcohol een ander verhaal, volgens de methode van verhalend ontwerpen

N.M.A. Glerum, A.N. Roodenburg

GGD Zuid-Holland West, Zoetermeer

E-mail: e.glerum@ggdzhw.nl

Bij 'Alcohol een ander verhaal' wordt gebruik gemaakt van de methode 'verhalend ontwerpen', een vorm van thematisch onderwijs, waarbij de leeractiviteiten verlopen als een verhaal. Een verhaal dat door de leerlingen zelf wordt ingevuld of afge-