

Abstracts posters

- Regionale richtlijn voor rationeel (eerste) voorschrijven van benzodiazepinen;
- Draagvlak onder betrokken beroepsgroepen voor regionale richtlijn en minimale interventie instrument en implementatie daarvan.
Tussentijdse resultaten (juni-nov 2006)
In proces:
- Website www.stoppenmetpillen.nl met minimale interventie instrument is operationeel in 4 pilot FTO groepen.
- Concept richtlijn opgesteld met expertgroep
- Inzet van psychiater als consulent in pilot FTO groepen heeft geleid tot verzoeken binnen GGZ instellingen en organisatie van zelfstandig gevestigd psychiaters om psychiaters over dit project voor te lichten en te laten deelnemen.
In meting:
- Er zijn alleen nog cijfers van de nulmeting beschikbaar.
Leerpunt .
- Receptuur gedefinieerd naar specialisme wordt nog niet goed geregistreerd in apotheken waardoor geen metingen per specialisme mogelijk zijn.
Bijdrage project aan ketenontwikkeling
- Inzet van psychiaters als consulenten in eerstelijns FTO's van huisartsen en apothekers, om transmurale communicatie en afspraken voorschrijfbeleid gezamenlijk vast te stellen.
- Nascholingsbijeenkomsten voor psychiaters (van regionale GGZ instellingen en zelfstandig gevestigd) in het kader van dit project, om afspraken voorschrijfbeleid tweede lijn te maken en voorschrijfgedrag van de tweede lijn te kunnen toetsen.
- Transmuraal symposium over dit onderwerp op 1 maart 2007 voor alle huisartsen, apothekers en psychiaters in de regio.

De gezondheid van wwbc-lienten (wet werk en bijstand) vergeleken met die van de algemene bevolking

A.B. de Kuijer, C.A. Kenens, P.F.L.A. Bisscheroux
GGD Zuidhollandse Eilanden, Spijkenisse
E-mail: a.de.kuijer@ggd-zhe.nl

Bij de uitvoering van de gezondheidsenquête onder volwassenen in 2005 is speciaal aandacht besteed aan inwoners van Spijkenisse met een lage sociaal-economische status (lage SES). Belangrijke thema's in het onderzoek zijn lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl, hulp en zorg en kinderen en opvoeden. Ook is ingegaan op werk en inkomen, wonen, woonomgeving en veiligheid en voorzieningen in de wijk en gemeente.

Uit het totale Wwb-cliëntenbestand is een aselechte steekproef van 500 personen in de leeftijd van 25 jaar en ouder getrokken. Indien gewenst, was het mogelijk om met hulp van een vrijwilliger van de GGD de Gezondheidsenquête in te vullen. De bruikbare respons was 35%, aanzienlijk lager dan de respons voor de algemene Gezondheidsenquête in Spijkenisse (62%).

De cijfers worden vergeleken met de resultaten die uit de Gezondheidsenquête van Spijkenisse komen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de verschillen tussen de algemene bevolking en de achterstandsgroepen. Enkele bevindingen: Wwb-cliënten ervaren vaker een matig tot slechte gezondheid (53%) dan de bevolking van Spijkenisse (14%). Zij rapporteren ook beduidend vaker lichamelijke ziekten en aandoeningen te heb-

ben. 40% van de cliënten uit het Wwb-bestand geeft aan zich zeer goed tot redelijk goed te voelen, versus 75% van de inwoners van Spijkenisse. 70% van de Wwb-cliënten heeft milde of ernstige angst- of depressieklachten (Spijkenisse 39%). 35% van de Wwb-cliënten zegt dat de eigen gezondheid vroeger niet, maar nu wel belemmerend werkt in het volgen van onderwijs of opleidingen. De lichamelijke gezondheid, leeftijd en een 'te lage' opleiding zijn de meest genoemde redenen voor het niet hebben van betaald werk dat genoeg is om van te leven. Een derde van de respondenten heeft het idee dat de situatie waarin zij terecht zijn gekomen ten koste gaat van de gezondheid.

De gezondheid van Wwb-cliënten is zoals verwacht ongunstiger dan die van de algemene bevolking.

Prevalentie van roken rondom de zwangerschap

C.I. Lanting,¹ J.P. van Wouwe,¹ D. Segaar,² M.R. Crone²

¹TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

²STIVORO, Den Haag

E-mail: careen.lanting@tno.nl

Roken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale morbiditeit en mortaliteit. Uit de laatste landelijke peiling naar rookgedrag rondom de zwangerschap in 1996 kwam naar voren dat 30% van de vrouwen een half jaar voor de zwangerschap rookte, 21% rookte tijdens de hele zwangerschap en 24% in het eerste half jaar na de zwangerschap. Wij onderzochten de rookprevalenties rondom de zwangerschap voor de jaren 2000-2003.

Rond de jaarwisselingen 2000/01, 2001/02 en 2002/03, zijn landelijke peilingen uitgevoerd. Hiervoor stelden we een anonieme vragenlijst op met daarin vragen over het rookgedrag van ouders, alsmede een reeks van achtergrond gegevens. Jaarlijks zijn ±5000 vragenlijsten op > 200 consultatiebureaus verspreid over Nederland meegegeven aan ouders van zuigelingen tussen 0 en 6 maanden oud (respons 63%, n=9133)

Vóór de zwangerschap rookte 25% van de vrouwen. In het laatste halfjaar voor de zwangerschap stopte 6%. Tijdens de zwangerschap rookte 14% van de vrouwen wel eens. Elf procent rookte de hele zwangerschap (dagelijks gemiddeld 5 sigaretten), 3% stopte ergens tijdens de zwangerschap. Van de moeders die vóór of tijdens de zwangerschap gestopt waren met roken begon tweederde na de bevalling niet opnieuw. Toch rookte 15% in het eerste half jaar na de zwangerschap. Van de ondervraagde moeders van zuigelingen van 0-6 maanden oud had 28% een partner die rookte (dagelijks gemiddeld 10 sigaretten). Deze vrouwen begonnen na de zwangerschap significant vaker (opnieuw) met roken (RR 2).

Vergeleken met 1996 roken minder vrouwen in het laatste halfjaar vóór de zwangerschap (30% toen, 25% nu), tijdens de gehele zwangerschap (21% toen, 11% nu) en het eerste half jaar na de zwangerschap (24% toen, 15% nu).